

Druga faza u strategiji sprečavanja i suzbijanja pandemijske gripe

Prva faza – od potvrde prvog slučaja do početka rujna

- **Cilj: Spriječiti širenje nove gripe A(H1N1)2009 sa importiranih slučajeva na domaće stanovnike - odgoditi uspostavu cirkulacije novog virusa u populaciji**
 - Lab dijagnostika svih sumnji
 - Pregled svih sumnjivih kod infektologa
 - Liječenje antivirusnim lijekovima svih potvrđenih
 - Izolacija svih potvrđenih (prvo u bolnici, zatim u kući)
 - Kemoprofilaksa svih kontakata

Prva faza – od potvrde prvog slučaja do početka rujna

- **Cilj: Spriječiti širenje nove gripe A(H1N1)2009 sa importiranih slučajeva na domaće stanovnike - odgoditi uspostavu cirkulacije novog virusa u populaciji**
 - Lab dijagnostika svih sumnji – **kliničari bris, HZJZ lab**
 - Pregled svih sumnjivih kod infektologa - **kliničari**
 - Liječenje antivirusnim lijekovima svih potvrđenih - **kliničari**
 - Izolacija svih potvrđenih (prvo u bolnici, zatim u kući)
 - **kliničari, epidemiolozi**
 - Kemoprofilaksa svih kontakata - **epidemiolozi**

Prva faza – od potvrde prvog slučaja do početka rujna

- **Vrlo uspješno**
 - Nitko na kemoprofilaksi nije obolio
 - Malobrojni sekundarni slučajevi, bez daljnjeg širenja na njihove kontakte
- **Veliko opterećenje laboratorija, infektoloških odjela i epidemiologa**
- **Velika potrošnja lijekova**
- **Upitna opravdanost tolikog opterećenja zdr. sustava (lab, inf. odjeli, epidem. sl.) i potrošnje lijekova, obzirom na težinu kliničke slike**
- **U zemljama s velikim priljevom inficiranih iz inozemstva, ova se strategija pokazala neuspješnom u sprečavanju širenja bolesti – kod nas uspješna!**

Krajem kolovoza - razlozi za napuštanje prve faze

- **Upitna opravdanost tolikog opterećenja zdr. sustava (lab, inf. odjeli, epidem. sl.) i potrošnje lijekova, obzirom na težinu kliničke slike**
 - U principu, ovakve mjere donesene kada se nije znalo kakva će biti težina bolesti, a očekivala se viša stopa komplikacija, smrtnosti i viši pobol
- **Zamor uključenih Službi – greške u slijeđenju preporuka**
 - Uzimanje uzoraka osobama koje ne odgovaraju definiciji bolesti i kojima nije ordinirana terapija, ne poštivanje izolacije bolesnih (zaražavali druge u bolnicama ili poslani kući bez preporuke o izolaciji)

Druga faza – od početka rujna nadalje

- **Cilj: zaštititi najosjetljivije od komplikacija bolesti i smrti**
 - Bolesnici se javljaju izabranom liječniku (telefonom) i ostaju kod kuće
 - Liječe se samo osobe s kroničnim bolestima / povećanim rizikom od komplikacija gripe i bolesnici s teškom kl. Slikom
 - Hospitaliziraju se samo oni sa teškom kl. slikom
 - Kemoprofilaksa samo teško imunokompromitiranim kontaktima
 - Lab dijagnostika samo hospitaliziranih i kod grupiranja

Druga faza – od početka rujna nadalje

- **Cilj: zaštititi najosjetljivije od komplikacija bolesti i smrti**
 - Bolesnici se javljaju izabranom liječniku (telefonom) i ostaju kod kuće - **Primarna zdravstvena zaštita!**
 - Liječe se samo osobe s kroničnim bolestima / povećanim rizikom od komplikacija gripe i bolesnici s teškom kl. Slikom
 - Hospitaliziraju se samo oni sa teškom kl. slikom
 - Kemoprofilaksa samo teško imunokompromitiranim kontaktima
 - Lab dijagnostika samo hospitaliziranih i kod grupiranja

Druga faza – od početka rujna nadalje

- **Smanjeno opterećenje laboratorija, kliničara, bolničkih kapaciteta, epidemiologa**
- **Smanjena potrošnja antivirusnih lijekova – važno sačuvati lijekove za jesensko/zimski val gripe za liječenje osjetljivih koji neće biti zaštićeni cjepivom (nedovoljne količine, kasna dostupnost, kontraindikacije, neučinkovitost)**
- **Važna uloga i značajan angažman primarne zdr. zaštite**

Slijedi...

- Cijepljenje sezonskim cjepivom
- Cijepljenje pandemijskim cjepivom
 - **Nužno pripremiti liječnike PZZ za zadatke**
- Cijepljenje pandemijskim cjepivom u sezoni gripe – puno bolesnih u ordinaciji, na telefonu, kućne posjete + veće količine cjepiva od uobičajenih
 - **Organizirat će se pomoć primarnoj zdravstvenoj zaštiti**

HVALA NA PAŽNJI

Oboljeli od gripe po danima

