

Poziv na cijepljenje četverovalentnim cjepivom protiv humanog papilomavirusa i informirani pristanak

Učenice i učenici se po prvi puta ove školske godine mogu cijepiti protiv HPV-a i to besplatno i dobrovoljno u cijeloj Republici Hrvatskoj. Do sada je besplatno cijepljenje bilo omogućeno samo u nekim gradovima i općinama.

1. Što je HPV?

Humani papilomavirusi (HPV) su virusi koji uzrokuju bradavice i abnormalan rast tkiva. Postoji više od 100 tipova humanih papilomavirusa, od kojih su neki povezani s genitalnim karcinomima. Tipovi HPV-a 16 i 18 uzrokuju otprilike 70% karcinoma vrata maternice (cerviksa). Većina HPV infekcija ne uzrokuje simptome i prolaze same od sebe. No HPV može uzrokovati karcinom cerviksa kod žena. Karcinom cerviksa je drugi uzrok smrti kod žena diljem svijeta. Prema Registru za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Hrvatskoj oko 350 žena oboli od invazivnog karcinoma cerviksa svake godine, a preko 100 ih umre.

2. HPV cjepivo: Zašto se cijepiti?

Ovo HPV cjepivo, koje je ponuđeno djevojkama i dječacima u prvom razredu osnovne škole, sadrži tipove HPV-a 6, 11, 16 i 18 i dostupno je pod nazivom Silgard. Koristi se u svrhu zaštite od karcinoma cerviksa, premalignih lezija (abnormalan rast stanica) u genitalnom području (cerviks, stidnica/vulva ili rodnica/vagina) i bradavina anogenitalnog područja uzrokovanih određenim tipovima humanog papilomavirusa. Očekuje se da je zaštita HPV cjepivom dugotrajna. Međutim, cijepljenje nije zamjena za skrining na rak vrata maternice. Žene i dalje trebaju redovno ići na ginekološke pregledе i citološki bris (Papanicolaou/"Papa" test). Ovo cjepivo sprečava oko 70% karcinoma cerviksa, oko 50% premalignih promjena na cerviku i oko 90% anogenitalnih bradavica.

3. Tko se treba cijepiti protiv HPV-a i kada?

Ovo HPV cjepivo se koristi u žena i djevojaka, mladića i muškaraca u dobi od devet godina na dalje.

Rutinsko cijepljenje će se provoditi kod djevojaka i mladića u prvom razredu srednje škole, a primjenjuje se kao dvije ili tri doze, ovisno o dobi. Djevojčice i dječaci u dobi do 13

Cijepljenje će provoditi nadležni školski liječnik, kojemu se možete obratiti za sve dodatne informacije (adresa, telefon, radno vrijeme za savjetovanje i cijepljenje):

Informirani pristanak za cijepljenje protiv HPV infekcije:

Ovime potvrđujem da sam prije cijepljenja upoznat/a s očekivanom djelotvornošću i mogućim nuspojavama cjepiva protiv HPV infekcije, te da se cijepljenjem ne umanjuje važnost preventivnih ginekoloških pregleda. Također, ovim potvrđujem da sam suglasan/na sa cijepljenjem.

Ime i prezime učenice/ka koja/i će se cijepiti

Potpis roditelja/staratelja, mjesto i datum, ,

Napomena: Molimo da učenica/k sa sobom poneće ovaj dokument, zdravstvenu iskaznicu i iskaznicu o cijepljenju, med. dokumentaciju ukoliko boluje od kakvih bolesti, uzima lijekove ili je bila na operativnom zahvatu. Sve napomene liječniku možete napisati na poleđini poziva. Učenice/i na cijepljenje dolaze same/i. Ukoliko roditelj/staratelj želi, može doći u pratnji učenice/ka.

godina primaju dvije doze u razmaku od šest mjeseci. Nakon četrnaestog rođendana cjepivo se prima u tri doze. Preporuča se razmak između prve i druge doze od dva mjeseca, te četiri mjeseca između druge i treće doze. HPV cjepivo se smije primjenjivati istovremeno sa drugim cjepivima.

4. Neke osobe ne bi trebale biti cijepljene s HPV cjepivom ili je cijepljenje potrebno odgoditi

- Osobe koje su imale alergijsku reakciju opasnu po život na bilo koju komponentu HPV cjepiva ili na prethodnu dozu HPV cjepiva ne smiju primiti ovo cjepivo. - Osobe koje su blago bolesne u trenutku predviđenog cijepljenja mogu se cijepiti. Osobe koje su ozbiljnije bolesne trebale bi odgoditi cijepljenje dok ne ozdrave. - Ukoliko se vaše dijete cijepilo nema potrebe da se ponovno cijepi.

5. Koji su rizici cijepljenja?

Ovo cjepivo je u upotrebi širom svijeta već više godina i pokazalo se sigurnim. Ipak, bilo koji lijek može uzrokovati ozbiljan problem, poput teške alergijske reakcije. Rizik razvoja ozbiljne nuspojave i smrti nakon primjene bilo kojeg cjepiva je izuzetno mali. Životno ugrožavajuće reakcije nakon cijepljenja su jako rijetke. Ukoliko bi došlo do razvoja takvih reakcija obično je to unutar par minuta do par sati nakon cijepljenja.

Poznata je pojava blagih do umjerenih reakcija nakon primjene HPV cjepiva. Ove reakcije ne traju dugo te prolaze same od sebe. Najčešće nuspojave cjepiva (kod više od 1 na 10 osoba) su glavobolja, mialgija (bol u mišićima), reakcije na mjestu injekcije uključujući bol, crvenilo i oticanje, te iscrpljenost (umor). Kratke nesvjestice i povezani simptomi (poput grčevitih pokreta) mogu se javiti nakon bilo kojeg medicinskog zahvata, uključujući i cijepljenje. Da bi se izbjegla pojava nesvjestica i ozljeda uzrokovanih padovima preporuča se ostati sjediti ili ležati oko 15 minuta nakon cijepljenja.

Kao sva cjepiva, HPV cjepivo će biti u kontinuiranom nadzoru za slučaj pojave neuobičajenih ili teških problema.