

ZNANJE POBJEĐUJE

→ **MIT:** HIV se prenosi kihanjem i kašljanjem, razgovorom, zagrljajem, rukovanjem, boravkom u istoj prostoriji sa zaraženom osobom.

ČINJENICA: HIV se **ne prenosi** uobičajenim socijalnim kontaktom. HIV se prenosi nezaštićenim spolnim odnosom, krvlju (najčešće uporabom nesterilnog pribora za injektiranje droga, tetoviranje ili piercing) i s majke na dijete.

→ **MIT:** Kontracepcijske tablete štite od HIV-a i drugih SPB

ČINJENICA: Kontracepcijske tablete štite od začeća (trudnoće). Kondom pruža istodobnu zaštitu od HIV-a i drugih SPB te neželjene trudnoće.

→ **MIT:** Po izgledu možemo prepoznati osobu koja je zaražena HIV-om ili drugom SPB.

ČINJENICA: SPB često nemaju nikakvih simptoma i zaražene osobe ne izgledaju niti se osjećaju bolesno. Zato je važno odgovorno ponašanje i prevencija.

1.12. Svjetski dan AIDS-a

Obilježava se diljem svijeta s ciljem osvještavanja javnosti o HIV/AIDS-u, pokazivanja solidarnosti prema oboljelim, doprinosa smanjenju stigme i diskriminacije i skretanja pozornosti na važnost odgovornog ponašanja.



Savjetovanje i pomoć telefonom, putem interneta i uživo

o zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja
možete potražiti u zavodima za javno zdravstvo -
savjetovalištima za HIV, a učenici i studenti i kod
školskog lječnika / u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
kod ginekologa i lječnika obiteljske medicine.

T: 01 48 63 345

E: hiv.savjet@hzjz.hr

F: facebook.com/CroAids

www.hzjz.hr

www.javno-zdravlje.hr

www.zdravlje.hr





Informiram se

- Spolno prenosive bolesti (SPB) prenose se: **nezaštićenim spolnim odnosom** sa zaraženom osobom.

Neke (HIV infekcija, hepatitis B, hepatitis C) se prenose **krviju, upotrebo nesterilnih predmeta za injektiranje droga, tetoviranje ili piercing te sa zaražene majke na dijete** u trudnoći, porodu i dojenju

- Moguće neželjene posljedice rizičnog ponašanja: zaraza sa SPB, neželjena trudnoća, ozbiljne zdravstvene komplikacije, nemogućnost ostvarenja željenog roditeljstva

- Rizici koji povećavaju vjerojatnost neželjenih posljedica: rani spolni odnosi zbog nedovoljne zrelosti sluznice, broj spolnih partnera, prisutnost drugih SPB, spolni odnosi pod utjecajem alkohola i droga koji smanjuju sposobnost rasuđivanja, povećavaju vjerojatnost neodgovornog ponašanja

- Najčešći simptomi SPB: bol, pečenje, svrbež, promjene kože ili sluznice, promijenjen iscijedak u području spolovila ili čmara, teškoće kod mokrenja, no često su simptomi oskudni ili ih nema

- Saznaj što TI možeš učiniti kako bi sprječio/la moguće neželjene posljedice, **te kada i gdje potražiti pomoć stručnjaka**



Odgovoran sam i brinem o zdravlju

- Preuzmi brigu za svoje zdravlje i odgovornim ponašanjem smanji rizik od zaraze
- Jednom kad započneš sa spolnim životom, primjenjuj savjete za sigurniji spolni odnos - **ABC strategiju** (od eng. Abstinence – izbjegavaj rane spolne odnose i spolne odnose pod utjecajem alkohola ili droge, Be faithful – ostvari obostrano vjernu vezu, Condom – redovito koristi kondom)
- Usluge tetoviranja i piercinga koristi samo onde gdje se koristi sterilna oprema
- Sudjeluj u informiranju drugih, promoviraj zdrave navike i antidiskriminaciju
- Tvoj odabir utječe na tvoju budućnost i živote ljudi oko tebe. Zato planiraj, ne riskiraj!



Idem na pregled, testiranje i savjetovanje

- Idi na **preventivni pregled kod liječnička** jednom godišnje
- Idi kod liječnika u slučaju pojave simptoma
- Idi kod liječnika u slučaju situacije kada se mogla dogoditi zaraza (nezaštićeni rizični spolni odnos, injektiranje droga, tetoviranje ili piercing u nesterilnim uvjetima...)
- **Pravodobno otkrivanje bolesti omogućuje uspješnije liječenje i održavanje zdravlja.** Liječenje smanjuje rizik razvoja komplikacija i pomaže u sprečavanju prijenosa zaraze na druge ljudi
- Dodatno, za zaštitu od hepatitisisa B i nekih tipova HPV infekcije postoji i zaštita cijepljenjem



Epidemiološki podaci - Hrvatska

- U prosjeku, mladi ljudi stupaju u spolne odnose nakon navršene 17. godine

Dio mlađih upušta se u rizična spolna ponašanja:

- Svaki peti petnaestogodišnjak ima rane spolne odnose, a od njih 1/5 ne koristi nikakvu zaštitu¹
- Samo 1/5 seksualno aktivnih mlađih 18-25 godina dosljedno koristi zaštitu²

koja mogu imati trenutačne ili dugoročne neželjene posljedice na zdravlje:

- 1200 djevojaka 15-19 godina godišnje rodi, od čega oko 10 djevojaka ispod 15 godina³
- 220 djevojaka 15-19 godina godišnje prekine trudnoću na zahtjev, od čega oko 150 maloljetnica^{3,4}
- učestalost klamidijske infekcije kod mlađih 18-25 godina: 3% muškaraca i 5,3% žena⁵
- rizik zaraze nekim od tipova HPV-a (rizični i nerizični) tijekom života procjenjuje se na 50-70%
- godišnje se u prosjeku zabilježi³:
 - 190 infekcija hepatitisom C
 - 150 infekcija hepatitisom B⁶
 - 40 oboljelih od sifilisa, 20 od gonoreje
 - 80 infekcija HIV-om
 - 350 oboljelih i 100 umrlih žena od raka vrata maternice
- čiji su uzročnici rizični tipovi HPV-a

¹ HBSC, HZJZ, 2010 ; ² Landripet i sur., 2011; ³ Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis, HZJZ, 2014.; ⁴ Prekidi trudnoće u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj u 2014., HZJZ; ⁵ Božičević i sur., 2011. 6. Nakon uvođenja cijepljenja protiv hepatitis B u Program cijepljenja primjećeno je značajno smanjenje broja infekcija hepatitisom B