

LEINI SIMBOLI ZA ISPITIVANJE VIDA U DJECE

Oftalmološki probirni pregled je potrebno učiniti s navršene 4 godine djeteta. Na oftalmološkom pregledu učinit će se testiranje vidne oštrine na oba oka, te zasebno s jednim i drugim okom, na blizinu i na daljinu. Testiranje vidne oštrine **nalikuje igri** odgonetavanja Leinih simbola, a traje svega nekoliko minuta te je **posve bezbolno** i bez opisanih posljedica u znanstvenoj literaturi. Dijete slobodno imenuje simbole. Dopustite svojem djetetu da nazove svaki od simbola kako želi. Važno je samo da isti simbol uvijek nazove jednakim imenom.



**RODITELJI, DOVEDITE SVOJE ČETVEROGODIŠNJE DIJETE
NA PROBIRNI PREGLED NA SLABOVIDNOST**

Roditelji djece rođene 1.1.2014. – 31.12.2014. mogu od pedijatra primarne zdravstvene zaštite zatražiti uputnicu za preventivni probirni pregled te se naručiti kod nadležnog oftalmologa.

Djeca rođena 1.1.2015. – 31.12.2015. će dobiti pozivno pismo dostavljeno na kućnu adresu s naznačenim točnim datumom, vremenom i mjestom pregleda.


P(r)ogledajmo na vrijeme!



**OFTALMOLOŠKI PREGLED VIDA S NAVRŠENE 4 GODINE
ŽIVOTA ZA SVU DJECU HRVATSKE**



NaDA
Nacionalni
Dan Ambliopije
12. rujna




ŠTO JE SLABOVIDNOST (AMBLIOPIJA)?

Ambliopija je **najčešća patologija vida** u djece i **vodeći uzrok sljepoće na jednome oku**, a definira se kao smanjenje ili gubitak dijela vidnih funkcija, osobito vidne oštine. Oko je organ koji poput antene prima svjetlosne podražaje, dok se stvarna slika svijeta koji gledamo oblikuje u vidnom dijelu mozga. Uzrok razvijene ambliopije je u izostanku dozrijevanja vidnoga dijela mozga zbog nedovoljne vidne stimulacije. Razvoj vidnoga dijela mozga je u 7. godini života djeteta gotovo u cijelosti završen. Stoga, ne liječi li se ambliopija u ranom periodu razvoja života djeteta, slabovidno oko **neće nikada dobro vidjeti**. Djeca se u pravilu ne žale na smetnje vida, a roditelji je ne mogu zamijetiti. Ambliopija mijenja samosvijest o sebi i ponašanje, anksioznost i depresija su češći, a izbor zanimanja je ograničen.

KAKO SE LIJEĆI SLABOVIDNOST?

Liječenje ambliopije ovisi o uzroku. Postoji li refraktivna greška, tada je potrebna korekcija naočalama ili kontaktnom lećom. Katkad je potrebno i zatvarati zdravo oko kako bi se poticao razvoj vida slabovidnog oka. Liječenje traje do postizanja za dob odgovarajuće vidne oštine, a to je moguće, u pravilu, do 7. godine života. Zakasni li se s liječenjem slabovidnosti, dijete više neće moći jasno vidjeti jer vidni dio mozga u ranom periodu rasta i razvoja nije bio stimuliran jasnom i oštrom slikom svijeta koji nas okružuje, pa stoga nije i neće biti razvijen.

**RODITELJI,
DOVEDITE SVOJE ČETVEROGODIŠNJE DIJETE
NA PROBIRNI PREGLED NA SLABOVIDNOST**



Preventivni
program
Za zdravlje. Danas.

Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti



**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE JE UVELO
PROBIR NA SLABOVIDNOST KAO OBAVEZAN
ZA SVU DJECU S NAVRŠENE 4 GODINE ŽIVOTA**