


MIKOPLAZMA



POSLEDICE SPI

SPOLNO PRENOSIVE INFEKCIJE MOGU UZROKOVATI NEPLODNOST MUŠCARCA I ŽENA, IZVANMATERNIČNE TRUDNOĆE I SPONTANE POBAČAJE, UPALE ILI OŠTEĆENJA DRUGIH ORGANA, UTJECATI NA ZDRAVLJE POTOMSTVA. HPV INFEKCIJA MOŽE UZROKOVATI NEKOLIKO SIJELA RAKA.

Zaštita od SPI

ZNANJE O SPI I ODGOVORNO SPOLNO PONAŠANJE Iznimno su važni za očuvanje spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Glavne mјere prevencije SPI su #edukacija, zaštita i testiranje.

Zaštita podrazumijeva tzv. **ABC** strategiju:

- A** (engl. abstinence) – APSTINICIJA ili suzdržavanje od spolnih odnosa
- B** (engl. be faithful) – biti VJERAN
- C** (engl. condom) – pravilna i dosljedna UPORABA KONDOMA

OSIM TOGA, JOŠ SU VAŽNI:

- ✿ Higijena
- ✿ Izbjegavati rizično spolno ponašanje
- ✿ Izbjegavati spolne odnose pod utjecajem alkohola i psihoaktivnih sredstava
- ✿ Redoviti preventivni liječnički preledi.



NAJUČESTALIJE SPOLNO PRENOSIVE INFEKCIJE (SPI)



HPV INFEKCIJA



UZROČNIK

Human papilloma virus (HPV). Poznato je više od 200 tipova HPV-a, od kojih su neki niskorizični (uzrokuju spolne bradavice), a neki visokorizični (mogu uzrokovati zloćudne promjene stanicu). Prenosi se spolnim odnosom (vaginalnim, analnim i oralnim). Najveći broj zaraženih osoba uspijeva svladati infekciju, no ako se virus zadrži u stanicama sluznice, promjene na stanicama mogu napredovati sve do razvoja raka.

SIMPTOMI

HPV ne uzrokuje simptome dok se već ne razvije bolest. Spolne bradavice (kondilomi) utvrđuju se vanjskim pregledom spolovila.

DNA metodom utvrđuje se postoji li infekcija i kojim tipom je osoba zaražena. PAPA-testom utvrđuje se postoje li promjene na stanicama.

Djevojke – rak se može razviti na vratu maternice, rodnici, stidnici, grlu i/ili anusu.

Mladići – rak se može razviti na sluznici genitalnoga područja, anusu, grlu i/ili penisu.

LIJEČENJE

Kondilomi - premazivanjem, smrzavanjem, spaljivanjem ili kirurškim odstranjivanjem.

Promjene na sluznici vrata maternice - laserski, elektrokoagulacijom ili kirurškim metodama.

PREVENCIJA

Najučinkovitiji oblik zaštite je da se odgovorno spolno ponaša i zaštiti pri svakom spolnom odnosu. Cijepljenjem se može zaštiti od 9 najčešćih tipova HPV-a, koje je besplatno za sve učenike 8. razreda osnovne škole. Cjepivo je najučinkovitije ako se primjeni prije prvoga stupanja u spolni odnos.

Cjepiva su visoko učinkovita, no redoviti ginekološki pregledi i dalje su potrebni.

KLAMIDIJSKA INFERCIJA



UZROČNIK

Bakterija *Chlamydia trachomatis*.

Najčešće ne izaziva nikakve tegobe zbog kojih bi potražio/la liječničku pomoć, zbog čega ju nazivamo „*tihom upalom*“. Često je neprepoznata i neliječena. Možeš ju dobiti nezaštićenim spolnim odnosom (oralnim, vaginalnim ili analnim) sa zaraženim partnerom.



SIMPTOMI

Djevojke – većinom bez simptoma.

Ako se ipak pojave, najčešći su svrbež oko spolovila ili anusa, peckanje pri mokrenju, promijenjen ili pojačan iscjadak, nelagoda u donjem dijelu trbuha, krvarenje iz rodnice izvan menstruacije.

Mladići – većinom bez simptoma. Ako se ipak pojave, najčešći su peckanje pri mokrenju, iscjadak iz spolovila, pečenje ili svrbež oko spolovila, nelagoda i bol u testisima.



LIJEĆENJE


Uspješno se liječi antibioticima, ali je važno da započneš s terapijom što ranije kao i tvoj partner. Da bi se potpuno izlječio/la suzdržavaj se od spolnih odnosa ili pri svakom spolnom odnosu upotrebljavaj kondom.



PREVENCIJA

Ponavljanje infekcije povećavaju rizik od neplodnosti. Ako imaš spolne odnose, upotrebljavaj kondom od samog početka do kraja spolnog odnosa.

GENITALNI HERPES



UZROČNIK

Herpes simplex virus (HSV).

Tip 1 najčešće uzrokuje upalu sluznice usne šupljine i desni te „*groznicu*“ usana, a tip 2 se najčešće povezuje s infekcijom vanjskih spolnih organa. Uzročnik se ne prenosi samo spolnim odnosom nego i dodirom sa zaraženim dijelom tijela.



SIMPTOMI

Crvenilo, peckanje, svrbež i izbijanje mjehurića (kao kod herpesa na usnama) simptomi su koji se mogu pojaviti nakon 2 do 14 dana. Mjehurići pucaju ostavljajući vrlo bolne ranice i stvaraju poteškoće pri mokrenju. Simptomi nestaju nakon 2 do 3 tjedna, ali virus ostaje trajno u tijelu te se bolest može ponovno pojaviti.



LIJEĆENJE


Protiv virusne infekcije nema učinkovitoga lijeka, možeš ju zalječiti, ali ne i izlječiti. Antivirusnom terapijom možeš ublažiti i smanjiti proširenost izbijanja mjehurića i skratiti trajanje bolesti.



PREVENCIJA

U trajanju akutne faze bolesti (vidljivi mjehurići i ranice) izbjegavaj spolne odnose. Prijenos infekcije možeš spriječiti ako ne diraš mjesto zahvaćeno herpesom.

GONOREJA (KAPAVAC, TRIPER, TRIŠA)



UZROČNIK


Bakterija *Neisseria gonorrhoeae*.

Najčešće zahvaća mokraćne i spolne organe. Kod oralnog spolnog odnosa infekcija zahvaća grlo, a kod analnog, rektum i anus. Karakteristične poteškoće javljaju se nekoliko dana nakon infekcije, obično 2-5 dana, a ponekad može proći i do 14 dana.



SIMPTOMI

Djevojke – nelagoda i/ili bol pri mokrenju u donjem dijelu trbuha, promijenjen i/ili pojačan iscjadak, krvarenje iz rodnice izvan menstruacije. Upala se može proširiti i na zdjelične organe, te prouzročiti probleme pri zanošenju i u trudnoći.



Mladići – peckanje i bol pri mokrenju, bijeli, žuti i/ili zelenkasti iscjadak iz spolovila, nelagoda, otok i bol u testisima.



LIJEĆENJE

Uspješno se liječi antibioticima, ali je važno da započneš s terapijom što ranije kao i tvoj partner. Da bi se potpuno izlječio/la, suzdržavaj se od spolnih odnosa ili pri svakom spolnom odnosu upotrebljavaj kondom.



PREVENCIJA

Ako imaš spolne odnose, upotrebljavaj kondom od samog početka do kraja spolnog odnosa.



UREAPLAZMA



UZROČNIK

Bakterija *Ureaplasma urealyticum*.

Pod većim rizikom su mladići i djevojke koji učestalo mijenjaju partnera i ne koriste zaštitu (kondom) tijekom spolnog odnosa. Osim spolnim putem bakteriju možeš dobiti korištenjem nečistih predmeta za intimnu uporabu, preko ručnika te u bazenu, sauni, salonu za masažu. Najčešće se infekcija pojavljuje bez simptoma. Međutim, s vremenom može doći do pojave simptoma koji mogu biti nalik simptomima ostalih spolno prenosivih infekcija te se s njima mogu lako zamijeniti.



SIMPTOMI

Djevojke – vaginalni svrbež, peckanje prilikom mokrenja, iscjadak, zdjelična bol, predmenstrualni simptomi kao što je spotting (oskudno krvarenje između menstruacija).

Mladići – bjelkasti iscjadak, svrbež i peckanje prilikom mokrenja.



LIJEĆENJE

Uspješno se liječi antibioticima, ali je važno da započneš s terapijom što ranije kao i tvoj partner. Da bi se potpuno izlječio/la, suzdržavaj se od spolnih odnosa ili pri svakom spolnom odnosu upotrebljavaj kondom.



PREVENCIJA

Ako si spolno aktivna/a ne postoji 100% siguran način kako da izbjegneš ovu SPI, međutim, možeš se zaštiti tako da upotrebljavaš kondom od samog početka do kraja spolnog odnosa.