



DIJABETES

Iskoristite svoje pravo na
godišnju dijabetičku kontrolu

Godišnja dijabetička kontrola

Iako se osjećate dobro i nemate tegobe, važno je ići na kontrole kod liječnika! Zašto?

Zato što se kasne komplikacije šećerne bolesti razvijaju tiho i na početku ne daju simptome. No, upravo ih je tada i važno otkriti, kako bi se njihov razvoj usporio ili potpuno zaustavio. Na kontrolama liječnik dobije uvid u Vaše zdravstveno stanje i može znati treba li Vam prilagoditi, dodati ili promijeniti terapiju.

Osim specifičnih kontrola koje inače provodi liječnik, važno je obaviti **godišnju dijabetičku kontrolu**. Tako se dobije kompletan pogled na Vaše zdravstveno stanje.

Kako izgleda **godišnja dijabetička kontrola**? To je pregled na kojem se:

- mjeri težina, visina, opseg struka, krvni tlak
- računa indeks tjelesne mase (ITM) (težina u kg / visina² u metrima)
- pregledaju stopala
- upućuje na pregled očiju
- upućuje na vađenje krvi i urina (HbA1c, masnoće u krvi, kreatinin, omjer albumina/kreatinina)
- razgovara o Vašim navikama (pušenju, konzumaciji alkohola, držanju dijete i samokontroli)

Tko provodi ovakav pregled? **Vaš izabrani liječnik obiteljske medicine.**

ITM	18.5-24.9
Tlak	<140/90mmHg
HbA1c	<7% (53 mmol/mol)



Zašto na pregledu mjerimo težinu i opseg struka?

Kod osoba koje imaju šećernu bolest, debljina povećava šansu za razvoj kroničnih komplikacija. Pokušajte smanjiti tjelesnu težinu barem za 5-10%. Već i to će dovesti do smanjenja tlaka, šećera i masnoća u krvi. Uredne vrijednosti su: ITM 18.5-24.9 kg/m², opseg struka kod žena treba biti < 80 cm, kod muškaraca < 94 cm.



Zašto mjerimo tlak?

Osobe oboljele od šećerne bolesti često imaju povišen tlak. Povišen tlak povećava šansu za razvoj komplikacija na velikim i malim krvnim žilama. Tlak ne smije preći 140/90 mmHg. No, ovisno o drugim bolestima koje možda imate, ciljane vrijednosti za Vas mogu biti i niže (manje od 130/80 ili manje od 120/80). Tlak ćete najbolje sniziti: smanjenim unosom soli, redovitom tjelesnom aktivnošću, mršavljenjem te uzimanjem tableta za tlak koje ste dobili od liječnika. Tlak mjerite kod svog odabranog liječnika svakih 1-2 mjeseca ako je povišen ili svakih 4-6 mjeseci ako su vrijednosti dobre. Ovo ne znači da ne trebate tlak mjeriti i kod kuće ako tako procijeni Vaš liječnik.





HbA1c

Što je Hemoglobin A1c (HbA1c)?

HbA1c se dobije vađenjem krvi. HbA1c pokazuje koliko je Vaša bolest dobro regulirana. Ako Vam propisani lijekovi ne odgovaraju ili Vaša dijeta nije učinkovita posljednja 3 mjeseca, HbA1c će to pokazati. Iako su Vam trenutne vrijednosti glukoze u krvi dobre, HbA1c može biti povišen. Test bi bilo dobro ponoviti svakih 6 mjeseci ili svaka 3 mjeseca ako nalaz nije dobar. Za većinu bolesnika, cilj je da HbA1c bude manji od 7% (53 mmol/mol). No za Vas ciljana vrijednost može biti i manja ili veća ako Vaš liječnik tako procjeni obzirom na druge bolesti i dob.



Zašto su povišene masnoće u krvi opasne?

Povišene masnoće su kod osoba oboljelih od šećerne bolesti još i opasnije nego kod osoba bez šećerne bolesti. Zbog stanja Vaših krvnih žila i oblika masnoća, ciljane vrijednosti masnoća su nešto niže nego kod osoba bez šećerne bolesti. Kolike bi Vam trebale biti masnoće u krvi, ovisi o Vašem ukupnom riziku od razvoja bolesti srca i krvnih žila. Taj rizik može Vam odrediti Vaš liječnik (ukoliko želite znati više, posjetite <http://www.heartscore.org/hr>). Protiv povišenih masnoća najbolje se boriti pravilnom prehranom, redovitom tjelesnom aktivnošću i tabletama za snižavanje masnoća koje Vam je Vaš liječnik propisao.



Kreatinin, omjer albumin/kreatinin

Ove vrijednosti se dobiju vađenjem krvi i urina. One pokazuju je li šećerna bolest oštetila Vaše bubrege. Pogotovo je koristan omjer albumin/kreatinin jer pokazuje oštećenje bubrega u jako ranoj fazi, kada se bubrezi još mogu oporaviti samo smanjivanjem šećera u krvi i tlaka i njihovim odgovarajućim liječenjem. Uredne vrijednosti: kreatinin kod žena treba biti ispod 90 umol/L, kod muškaraca ispod 104 umol/L; omjer albumin/kreatinin treba biti ispod 30 ug/mg. Za omjer albumin/kreatinin od 30 do 300 ug/mg koristi se naziv mikroalbuminurija, a smatra se da je potpuni oporavak bubrega još uvijek moguć.



Zašto pregledavamo oči?

Osobe oboljele od šećerne bolesti imaju povećanu šansu za razvoj dijabetičke retinopatije. To je bolest koja oštećuje mrežnicu oka i dovodi do sljepoće. No, ako se dijabetička retinopatija rano otkrije, dok još ne daje simptome, može se liječiti. Tako se može spriječiti sljepoća. Zato je oči potrebno pregledavati barem jednom godišnje iako nemate smetnje vida. Vaš okulist će možda odrediti i češće ili pak rjeđe kontrole.





Zašto pregledavamo stopala?

Osobe oboljele od šećerne bolesti imaju povećanu šansu za razvoj dijabetičkog stopala. Šećerna bolest smanjuje osjet u Vašim stopalima i zato je moguće da ozlijedite stopalo bez da ste toga svjesni, jer niste osjetili bol. Također je moguće da ni ne primijetite da Vam se od ozljede napravila ranica. Zbog često začepljenih krvnih žila na nogama, rane kod osoba sa šećernom bolešću teže cijele i zato se ranica može brzo pretvoriti u veliku ranu ili gangrenu. Zato Vaš liječnik barem jednom godišnje mora: pregledati kožu stopala, ispitati imate li trnce u stopalima i imate li smanjeni osjet u stopalima. Pregledavajte i sami svoja stopala kod kuće. **Vaš liječnik** može odrediti da to morate činiti i svaki dan. Ako primijetite promjene, posavjetujte se s liječnikom.



Zašto je važno razgovarati o navikama (pušenju, alkoholu, dijeti, samokontroli)?

Da biste uspješno mijenjali sadašnje navike, morate prvo znati na čemu ste. Morate osvijestiti svoje sadašnje stanje. To ćete najbolje učiniti u razgovoru s liječnikom barem jednom godišnje.

Što se alkohola tiče, važno je znati da se ne preporučuje više od jednog pića dnevno za žene i dva za muškarce. Dodatno pazite jer alkohol može uzrokovati smanjenje šećera u krvi (hipoglikemiju) i do 24 h nakon konzumacije!



Podsjetnik za provođenje godišnje kompletne kontrole osoba sa šećernom bolešću

Panel: ŠEĆERNA BOLEST


MKB 10	<input type="text"/>	tip šećerne bolesti: tip1 <input type="radio"/> tip2 <input type="radio"/> drugi <input type="radio"/> neodređen <input type="radio"/> gestacijski <input type="radio"/>
Godina postavljanja dijagnoze bolesti:		<input type="text"/>
Tjelesna visina:	<input type="text"/> cm	ITM: * <input type="text"/> kg/m ²
Tjelesna masa:	<input type="text"/> kg	Pušenje: DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/> Bivši pušač: <input type="radio"/>
Opseg struka:	<input type="text"/> cm	Konzumiranje alkohola: DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>
		Redovita tjelesna aktivnost: DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>
		Pridržavanje dijabetičke dijetе: DA <input type="radio"/> DJELOMIČNO <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>
		Suradljivost bolesnika: DA <input type="radio"/> DJELOMIČNO <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>
GLIKEMIJA		
Samokontrola: DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/> Broj mjerena GUP/tjedan: <input type="text"/>		
GUP-nt	<input type="text"/> mmol/L	Pregled dijabetologa u proteklih 12 mjeseci: DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>
GUP-pp	<input type="text"/> mmol/L	Hospitalizacija u proteklih 12 mjeseci: DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>
HbA1c:	<input type="text"/> %	hipoglikemija / 3 mjeseca: DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>
	<input type="text"/> mmol/mol	teških hipoglikemija / 3 mjeseca: DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>
TERAPIJA:		
naziv lijeka	<input type="text"/>	dnevna doza <input type="text"/>
naziv lijeka	<input type="text"/>	dnevna doza <input type="text"/>
naziv lijeka	<input type="text"/>	dnevna doza <input type="text"/>
		kontinuirano mjerjenje glukoze: DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>
		inzulinska pumpa: DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>
ARTERIJSKI TLAK		
SISTOLIČKI	<input type="text"/> mmHg	DIJASTOLIČKI <input type="text"/> mmHg
TERAPIJA:		
naziv lijeka	<input type="text"/>	dnevna doza <input type="text"/>
naziv lijeka	<input type="text"/>	dnevna doza <input type="text"/>
naziv lijeka	<input type="text"/>	dnevna doza <input type="text"/>
IM u proteklih 12 mjeseci: DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>		
CVI u proteklih 12 mjeseci: DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>		
LIPIDOGRAM		
ukupni kolesterol	<input type="text"/> mmol/L	HDL kolesterol <input type="text"/> mmol/L
trigliceridi	<input type="text"/> mmol/L	LDL kolesterol <input type="text"/> mmol/L
TERAPIJA:	naziv lijeka <input type="text"/>	dnevna doza <input type="text"/>
	naziv lijeka <input type="text"/>	dnevna doza <input type="text"/>
		NAFLD/NASH: DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>
BUBREŽNA FUNKCIJA		
albumin (urin)	<input type="text"/> mg/L	omjer albumin/kreatinin (urin) <input type="text"/>
proteini (urin)	<input type="text"/> mg/dan	
kreatinin (serum)	<input type="text"/> µmol/L	* proc. glomerularna filtracija <input type="text"/> (ml/min/1.73 m ²)
PREGLED OČIJU		
Oftalmoskopija:	DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>	Dijabetička retinopatija DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>
		Neproliferativna retinopatija DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>
		Proliferativna retinopatija DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>
		Makulopatija DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>
PREGLED STOPALA		
Pregled stopala:	DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>	Diabetička polineuropatija DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>
Normalan osjet vibracije:	DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>	Zacijseljeni vrijed DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>
Normalan osjet monofilamenta:	DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>	Akutni vrijed/gangrena DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>
Arterijske pulzacije prisutne:	DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>	Premoštenje/angioplastika DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>
		Amputacija udova DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/>
		dio stopala/stopalo <input type="radio"/> potkoljenična <input type="radio"/> natkoljenična <input type="radio"/>

*izračun temeljem upisanih podataka

Iskoristite svoje pravo na godišnju dijabetičku kontrolu
jer već i samo provođenje kontrole pomaže Vam u regulaciji bolesti

**Preuzmite kontrolu. Upitajte svog
liječnika za savjet, zatražite pomoć, protiv
dijabetesa se može i isplati boriti.**

Zajedno smo jači



Zatražite svog liječnika da i Vama učini godišnju dijabetičku kontrolu i zamolite ga da rezultate evidentira u CroDiab registar ili prijavi putem Panela



Co funded
by the Third Health Programme
of the European Union



Ministarstvo
zdravstva



Hrvatski
zavod za
zdravstveno
osiguranje

