

Obrisak spojnice oka za virološku

- Ako nema dovoljno eksudata (spojnica je suha) prije uzimanja obriska, obrisak (drveni štapić s vatom) treba umočiti u transportni medij ili sterilnu fiziološku otopinu.
- Treba dobro obrisati spojnicu donje vjeđe i forniksa od vanjskog prema unutarnjem kutu oka.
- Ako treba uzeti obrisak spojnice oba oka, za svako oko treba koristiti poseban bris i dostaviti u prijemnu ambulantu odvojeno, svakog u svojem sterilnom kontejneru.
- Uzorci se mogu uzeti u laboratorijima Službe za mikrobiologiju Zavoda ili se mogu uzeti u ambulantama.
- Obriske treba dostaviti u prijemnu ambulantu što prije, najbolje u roku od dva sata.
- Ako to nije moguće, obriske u transportnoj podlozi treba dostaviti tijekom 24 sata. Uzorke za bakteriološku i mikološku pretragu treba dostaviti u torbi na 20 – 25 °C, a uzorke za virološku pretragu u termosici na +4 °C.
- Za dokaz trahoma preporučujemo uzimanje obrisaka spojnice oka u prijemnoj ambulanti Službe za mikrobiologiju ili prema dogovoru s liječnikom mikrobiologom.